



Süt Veriminde Besleme



Koyun ve keçilerde, ırklara göre ortalama günlük süt verimi değerleri 1 ile 4 litre arasındadır ve koyunlarda laktasyon dönemi ortalama 4-5 ay sürer. Süt verimine bağlı olarak anne sütü genellikle 4-6 hafta yavru beslenmesinde kullanılır. Daha sonra yetiştirme modeline bağlı olmak şartıyla oğlak ve kuzular tamamen süttten kesilerek sağım yapılır. Koyunlarda süt veriminin en yüksek olduğu dönem, kuzulamadan sonraki ilk 6-8 haftalık dönemdir. Bu nedenle, bu dönemdeki dengeli ve yeterli besleme, en yüksek düzeyde süt elde etme ve süt üretimiyle koyunun vücudundaki besin maddesi kaybını en az düzeye indirmek için gereklidir. Diğer yandan, annelerinden yeterli miktarda süt emen kuzular da hızlı gelişirler.

Bunun yanında, laktasyondaki koyunlarda aşağıdaki pratik yemleme programlarından birinin kullanımı uygundur:

** Hayvanlar çayır otu + baklagil karışımı veya körpe tahıl hasıllı meralarda otlatılmalıdır. Eğer meralar ot bakımından yetersizse, hayvanların otlatılması bir şekilde kısıtlanıyorsa, sürüde çoklu doğum yapan veya düşük kondisyonlu hayvanlar bulunuyorsa, hayvan başına günde 450-500 g ek konsantre yem verilmelidir.

** Kaliteli kuru baklagil otu veya kaliteli kuru çayır+baklagil karışımı otuna (serbest olarak) ek olarak 450-700 g/gün hayvan konsantre yem verilmelidir.

** Kaliteli kuru ayır otuna (1.82 kg/gün hayvan), ek olarak 120 g/gün hayvan protein karması+450-700 g/gün hayvan tahıl tanesi verilmelidir.

** Mısır silajı (2.72-3.63 kg/gün hayvan) + 136-182 protein karması/gün hayvan + 450-700 g/gün hayvan tahıl tanesi +18 gr/gün kire taşı verilmelidir.

** Kaliteli kuru baklagil otu (900 g/gün hayvan) + mısır silajı (1.82-2.27 kg/gün hayvan) + protein karması yemi (100 g/gün hayvan) + tahıl tanesi (450 g/gün hayvan) verilebilir.

Eğer işletmede kaliteli kaba yem bulunamıyorsa, samandaki eksik besin maddeleri, kuru şeker pancarı posası, buğday kepeđi, küspeler ve tahıl taneleri ile dengelenerek pratik yemleme programları geliştirilmelidir.

Başyem A.Ş